



## Neophyten Frühwarnliste des Kantons Zürich

Diese Liste beinhaltet gebietsfremde Pflanzen, die im Kanton nachweislich verwildern,

- aber noch auf keiner Liste stehen (Schwarze Liste oder Watch Liste),
- noch eher unbekannt sind,
- erst seit kurzem in Ausbreitung begriffen sind oder
- unklar ist, ob sie in Zukunft invasiv werden & gut beobachtet werden müssen.

Mithilfe dieser Liste möchten wir auf diese Pflanzen aufmerksam machen und das Bewusstsein für deren Vorkommen in der Natur verstärken. Denn durch Prävention und dem Motto «Wehret den Anfängen» können grosse Schäden und teure Bekämpfungsmassnahmen verhindert werden.

Eine dieser Arten gefunden?

- Bitte im GIS eintragen – denn diese Arten sind noch wenig gemeldet und das wahre Ausmass der Verbreitung ist weitgehend unbekannt.
- Falls möglich: sofortige Bekämpfung – Achtung: bitte den GIS-Eintrag aktualisieren.

### Mahonie

*Berberis aquifolium* / *Mahonia aquifolium*



Herkunft:  
Nordamerika



Strauch, immergrün, bis 2 m hoch, ohne Dornen.  
Zusammengesetzte Blätter.  
Blütenfarbe: gelb. Frucht: purpurschwarze, bläulich bereifte Beeren.

Ausbreitung in: Gärten, Wälder

### Julianas Berberitze

*Berberis julianae*



Herkunft:  
Asien



Strauch, immergrün (die einheimische *B. vulgaris* ist sommergrün), 2-3 m hoch.  
Blätter quirlig angeordnet, mit langen Blattdornen besetzt.  
Blütenfarbe: gelb. Frucht: längliche, blaubereifte Beeren.

Ausbreitung in: Wälder

### Blasige Steinmispel / Runzelige Zwergmispel

*Cotoneaster bullatus*



Herkunft:  
Asien



Strauch, sommergrün, bis 2 m hoch. Blätter durch das Adernetz runzelig, oberseits glänzend, unterseits graugrün behaart. Blütenfarbe: weiss-blassrosa. Frucht: leuchtend rot.

Ausbreitung in: Hecken, Strauchflächen, Bergwälder



### Weidenblättrige Steinmispel

*Cotoneaster salicifolius*



Foto: Sten / CC BY-SA 3.0



Herkunft:  
Asien



Strauch, immergrün, bis 5 m hoch. Blätter lanzettlich und leicht runzelig, oberseits glänzend, unterseits filzig. Blattstiel häufig rot gefärbt. Blütenfarbe: weiss. Frucht: leuchtend rot.  
Ausbreitung in: Offene Flächen, Mischwälder, Bergwälder

### Kleinblättrige Zwergmispeln

*Cotoneaster divaricatus*, *C. franchetii*, *C. horizontalis* (abgebildete Art)



Foto: peganum / CC BY-SA 2.0



Herkunft:  
Asien



Sträucher, sommergrün. Blätter wechselständig, maximal 3 cm lang, meist kleiner als 1 cm. Rote Herbstfärbung. Blütenfarbe: weiss / hellrosa. Frucht: leuchtend rot.

Ausbreitung in: Trockenweiden, steinige Standorte

### Immergrüne (Kriech-) Heckenkirsche

*Lonicera nitida* (und *L. pileata*)



Herkunft:  
Asien



Sträucher, immergrün. Blätter gegenständig, klein (bis 1,5 cm: *L. nitida*; bis 4 cm: *L. pileata*), oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits heller. Blütenfarbe: gelblich-weiss. Frucht: glänzend dunkelviolet (*nitida*) bis glasig-violett (*pileata*).  
Ausbreitung in: Wälder

### Paulownie / Blauglockenbaum

*Paulownia tomentosa*



Herkunft:  
Asien



Baum, sommergrün. Schnellwachsend: bis 4 m/ Jahr. Blätter bis über 30 cm lang. Blütenfarbe: lila-blauviolett. Frucht: Nussförmige Kapseln (verbleiben im Winter am Baum - Bestimmungshilfe).  
Ausbreitung in: Gebüsche, Wälder, Ödland, Stadt



**Seidiger Hornstrauch**  
*Cornus sericea*



Herkunft:  
Nordamerika



Strauch, sommergrün. Rote Zweige. Blütenfarbe: weiss. Frucht: weiss-hellgrau. Unterschied zu einheimischem Hartriegel (*Cornus sanguinea*): Blattnervatur mit mehr als 4 Paaren an Seitennerven (5-7) Ausbreitung in: Gebüsche, Hecken, Wälder

**Runzelblättriger Schneeball**  
*Viburnum rhytidophyllum*



Herkunft:  
Asien



Strauch, immergrün, bis 4 m hoch. Blätter länglich (bis 20 cm) und stark runzelig, unterseits filzig behaart. Blütenfarbe: weiss bis gelblich. Frucht: zuerst rot, zur Reife hin schwarz gefärbt. Ausbreitung in: Wälder und Gebüsche

**Japanische Weinbeere / Rotborstige Himbeere**  
*Rubus phoenicolasius*



Herkunft:  
Asien



Strauch; die Wuchsform entspricht der Brombeere. Die Schösslinge sind leicht an ihrer roten Farbe zu erkennen, da sie dicht mit rötlichen Drüsenborsten besetzt sind. Blütenfarbe: rosa oder weiss. Frucht: Ähnelt einer Himbeere. Ausbreitung in: Wälder

**Vielblütige Rose**  
*Rosa multiflora*



Herkunft:  
Asien



Strauch, bis 2 m. Die für Rosen typischen Nebenblätter sind auffällig kammförmig zerschlitzt (siehe Abbildung). Bildet sehr viele Blüten in Rispen aus. Blütenfarbe: weiss bis blassrosa. Frucht: dunkelrot. Ausbreitung in: Ballungsräume, Bahntrassen.



## Chinesische Hanfpalme

*Trachycarpus fortunei*




Herkunft:  
Asien



Palme, bis 15 m hoch. Stamm bis 20 cm dick. Zweihäusig. Blütenfarbe: gelb. Früchte: zuerst grünlich, später schwarzpurpurn. Ausbreitung in: Feuchte Waldstandorte (Tessin), wärmebegünstigte Standorte (Nördlich der Alpen)

## Teufelskrückstock

*Aralia elata*



Herkunft:  
Asien



Strauch oder kleiner Baum, bis 5 m hoch. Mehrstämmig, dicht mit Stacheln besetzt. Blätter gefiedert, bis 80 cm lang, rote Herbstfärbung. Blütenfarbe: weiss. Frucht: beerenartige Steinfrucht, zur Reife tiefblau bis schwarz gefärbt. Ausbreitung in: Wälder

Fehlt eine Art auf dieser Liste?

Dann melden Sie uns bitte den Standort mit Bildern.